

Descripción

Es un antibiótico que contiene un Lincosánido con actividad de macrólido y un aminoglucósido que completa la acción abarcando Gram+, Gram- y Micoplasma.

Composición

Lincomicina HCl 22 gr.- Sulfato de Gentamicina 22 gr.
Excipiente c.s.p. 1000 gr.

Presentación

Bolsas de 25 Kg



Indicaciones

En pollos de corte: Prevención y manejo del ERC complicado por Micoplasma y Coli.

Núcleo reproductor: Manejo y prevención de Clostridiosis que se lo asocia como probiótico para minimizar el efecto de toxinas. Manejo de Micoplasmosis y artritis bacteriana.

En cerdos: Prevención y manejo de disentería, micoplasmosis, pulmonía bacteriana, Enteritis por E. coli y Salmonella.

Dosificación

Pollos: Dosis para manejo de ERC, 1 Kg/ton de ración por 3 a 5 días. Núcleos altamente reproductivos: Clostridiosis 1.5 Kg/Ton de ración por 7días, Artritis 1.5 Kg/Ton de ración por 3 a 5 días. En agua de bebida usar la mitad de la dosis.

Cerdos: Dosis para tratamiento: 2.5 Kg/Ton de ración durante 7días.

Período de retiro: Suspender el tratamiento 14 días antes del sacrificio de aves y cerdos.

Período de retiro

Suspender el tratamiento 14 días antes del sacrificio de aves y cerdos.



EVANCE
AN ALIVIRA GROUP COMPANY