

SUVAXYN RESPIFEND APP

DESCRIPCION

Bacterina elaborada con los serotipos 1,5 y 7 de *Actinobacillus pleuropneumoniae*

COMPOSICION

Actinobacillus pleuropneumoniae (serotipos 1, 5 y 7), bacterina.

ACCION

Inmunización contra los serotipos 1,5 y 7 de *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

INDICACIONES

Para la vacunación de porcinos sanos contra la enfermedad causada por *Actinobacillus pleuropneumoniae*

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

Agitar el contenido del frasco antes de aplicar.
Conservar entre 2 y 7° C.
Como todo medicamento, mantener fuera del alcance de los niños.

EFFECTOS COLATERALES

Como puede suceder con cualquier producto inyectable, pueden presentarse reacciones de tipo anafiláctico. En este caso, aplicar epinefrina.

DOSIFICACION

Inyectar asépticamente por vía intramuscular (IM) una dosis de 2mL por animal.
Lechones: Inyectar a las 4 semanas de edad o mayores y repetir a las 3 o 4 semanas.
Cerdos de engorde: Inyectar una vez al arribo y repetir la vacunación a las 3 a 4 semanas.
Lechones para la venta: Dependiendo del estatus de la piara, puede administrarse una tercera inyección antes de los períodos de desafío.
Reproductores: Vacunar con dosis aplicadas con 3 a 4 semanas de diferencia. Administrar la primera dosis a los 6 meses de edad o antes de la introducción a la piara. Revacunar con una dosis solamente semianualmente.



ESPECIES



PRESENTACION

Frasco con 50 dosis.

RESTRICCIONES DE USO

No vacunar dentro de los 60 días previos al sacrificio de los animales.

APLICACION

Inyectable